

تشخیص

شناسایی موارد مشکوک در انسان نیاز به تستهای آزمایشگاهی دارد و ویروس را می توان در هفته اول بیماری توسط آزمایشات مربوطه جداسازی نمود.

درمان

در دام بدلیل نبودن علایم درمانگاهی درمان انجام نمی گیرد. در انسان اقدامات درمانی و کمکی صورت می گیرد که در موارد شدید و پیشرفته بیماری این اقدامات منتج به نتیجه نخواهد شد.

راههای پیشگیری از بیماری:

- ۱- اجتناب از کشتار غیرمجاز دام
- ۲- رعایت مواردایمنی و بهداشتی هنگام کار با دام نظیر استفاده از ماسک، چکمه، دستکش و لباس کار مناسب
- ۳- اجتناب از جداسازی و له کردن کنه های موجود روی بدن دام
- ۴- اجتناب از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن در هنگام انجام اموری که با دام سرو کار دارد.
- ۵- شستشو و ضدعفونی نمودن دست ها، وسایل و لباس کار پس از اتمام کارهایی که به هر نحوی با دام ارتباط داشته باشد.
- ۶- تماس انسان با خون و بافت آلوده دام می تواند برای انسان بیماریزا باشد و لازمست قبل از انجام کارهایی که ریسک خطر دارد از عدم وجود خراش و جراحت سطحی در پوست مطمئن شوید.
- ۷- خودداری از هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش دام های مشکوک و غیربومی و بدون مجوز دامپزشکی بویژه در مناطقی که سابقه بروز بیماری وجود دارد.

۸- از آنجا که کنه ها ناقل بیماری می باشند سم پاشی دام و اماکن دامی و منازل جهت از بین بردن کنه ها الزامیست.

۹- از هرگونه تماس با خون و ترشحات دام کشتار شده و خون و ترشحات بدن فرد مبتلا بایستی پرهیز گردد.

۱۰- در کشتارگاههای دام در صورت ایجاد هرگونه زخم یا جراحت پوستی در حین کشتار و یا بروز علایم بیماری سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

۱۱- هنگام تکه تکه یا چرخ کردن گوشت و آلایش خوراکی از دستکش استفاده نمایید.

۱۲- از مصرف گوشت تازه ذبح شده اجتناب نموده و توصیه می شود به مدت ۲۴ ساعت لاشه گوسفند پس از ذبح در یخچال با دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شود که این مدت برای آلایش خوراکی ۴۸ ساعت می باشد.

۱۳- اجتناب از مصرف گوشت های فاقد مهر دامپزشکی.



سازمان تحقیقات
پزشکی و بهداشت

اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
آموزش و ترویج

تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو

(CCHF)

Crimean Congo
Hemorrhagic Fever

راههای ارتباط

شماره تماس

۰۴۵ - ۳۳۳۹۴۸۰۰

فاکس

۰۴۵- ۳۳۳۹۴۶۵۵

وب سایت

<https://ardabil.ivo.ir/>