

اقدامات

امنیت زیستی در خصوص
کنترل آنفلوآنزای فوق حاد

پرندگان

قابل توجه مرغداران محترم

جهت کاهش احتمال ورود ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به فارمهای پرورش، لازم است اقدامات زیر را به صورت جدی در واحد معمول فرمایید:

۱- قبل از جوجه ریزی نسبت به پاکسازی و ضد عفونی کامل فارم با دقت کامل اقدام نمایید.

۲- قبل از اقدام به جوجه ریزی، با دامپزشکان در زمینه برنامه امنیت زیستی و برنامه های پایش گله مشورت نمایید.

۳- قبل از ورود جوجه، دان مورد نیاز را تامین نموده و از تهیه دان از منابع مشکوک اکیدا خودداری نمایید.

۴- جوجه مورد نیاز را از منابع مطمئن تهیه و در ابتدای ورود، جوجه های واژده را از گله حذف نمایید. جوجه ها در هفته اول نیاز به مراقبت بیشتری دارند.

۵- شرایط محیطی مناسب را جهت پرورش جوجه ها فراهم آورید، تهویه، حرارت و رطوبت نامناسب زمینه ساز رشد اجرام بیماریزا می باشد.



۱۰- در واحدهای تخمگذار و گوشتی نسبت به برقراری سیستم قرنطینه و دوش اقدام نموده و کارکنان و همه افرادی که به مرغداری مراجعه می کنند) شامل واکسیناتورها، دامپزشکان، بازدیدکنندگان) باید بهداشت فردی شامل دوش گرفتن، پوشیدن لباس کار، چکمه، ماسک، کلاه، عینک و دستکش را رعایت کنند.

۱۱- اختصاص لباس و کفش مجزا برای کار در محوطه و کار داخل سالن الزامیست. لباس ها مرتب شده شده و استفاده کارکنان از آنها برسی شود.

۱۲- از کلیه پرسنل شاغل تعهدی مبنی بر عدم نگهداری مرغ بومی، زیستی و یا هر نوع پرنده دیگر در منزل اخذ شود.

۱۳- برای هر سالن کارگر جداگانه در نظر گرفته شود و از تردد افراد بین سالنهای بیویژه در زمان وقوع تلفات جدا جلوگیری شود.

۱۴- در ورودی فارم و نیز ورودی هر سالن، حوضچه ای جهت ضد عفونی چکمه ها و نیز مواد ضد عفونی کننده دست ها تعییه گردد.

۱۵- حوضچه های ضد عفونی تمیز نگه داشته شده و روزانه (حتی زودتر و در موقع لزوم) تعویض شوند.

۱۶- در اولین فرصت نسبت به آزمایش آتاژیز آب مصرفی اقدام و سپس هر ۶ ماه یکبار تکرار نموده و از سلامت آب مطمئن شوید. در صورت آلوهه بودن آب با مشورت کارشناس مربوطه رفع نقص نمایید.

۱۷- از نگهداری گله در چند سن خودداری نموده و فاصله مناسب بین دو جوجه ریزی در نظر گرفته شود. در صورت نیاز و در شرایط اضطراری، پرندگان تازه وارد قرنطینه شده و پس از طی دوره قرنطینه به سالنهای روانه شوند.

۶- کلیه سطوح سالن پرورش و نیز انبار دان اعم از کف، سقف، دیوارهای داخلی و خارجی بایستی صیقلی و قابل شستشو و ضد عفونی باشند.

۷- با ایجاد تمهیدات لازم از ورود پرندگان و جوندگان به داخل سالن و انبار دان بطور جدی جلوگیری نمایید.

۸- از ورود افراد متفرقه به فارم اکیداً جلوگیری نمایید.

۹- واحدهای پرورش مرغ مادر نسبت به اصلاح سیستم دوش و یکطرفه نمودن مسیرهای ورودی به فارم اقدام نمایند.



اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
واحد آموزش و ترویج
کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

<https://ardabil.ivo.ir>

شماره تلفن های تماس ادارات دامپزشکی شهرستان های استان اردبیل

۰۴۵۳۳۳۹۴۸۰۰
۰۴۵۳۲۸۷۷۸۵۱
۰۴۵۳۲۷۲۲۳۲۵
۰۴۵۳۲۷۴۳۵۸۷
۰۴۵۳۲۴۲۳۴۴۶
۰۴۵۳۲۲۲۳۳۲۰
۰۴۵۳۲۹۹۲۳۰۲۳
۰۴۵۳۲۵۶۴۳۱۹۹
۰۴۵۳۲۵۳۴۹۳۲
۰۴۵۳۲۳۲۲۳۶۹۶
۰۴۵۳۲۲۸۲۱۱۳

شهرستان اردبیل
شهرستان بیله سوار
شهرستان پارس آباد
شهرستان اصلاندوز
شهرستان خلخال
شهرستان سرعین
شهرستان کوثر
شهرستان گرمی
شهرستان مشگین شهر
شهرستان نمین
شهرستان نیر

سامانه اداره کل دامپزشکی استان اردبیل

<https://ardabil.ivo.ir>

دفن بهداشتی



۱۸- ورود کلیه کامیون ها به مرغداری ها و کارخانجات جوجه کشی پس از عبور از حوضچه ضد عفونی صورت گیرد به شکلی که چرخ ها و دیواره های بیرونی کامیون به طور کامل ضد عفونی شوند.

۱۹- کلیه ورود و خروج ها ثبت شود تا امکان ردیابی عامل انتقال دهنده میسر گردد.

۲۰- کلیه اقدامات منجمله واکسیناسیون، نوع واکسن، شماره بیج واکسن و نام افراد واکسیناتور در دفتر ویژه ای یادداشت شود.

۲۱- نسبت به پاییش گله از نظر تیترهای ایجاد شده و نیز احتمالاً ورود اجرام بیماریزای جدید اقدام نمائید این دوره با تاکید بیشتر در گله های تخمگذار (اجداد، مادر، تجاری) باید صورت پذیرد.

۲۲- از وارد آوردن استرس های بی مورد به گله از قبیل ورود افرا بطور ناگهانی، ایجاد سر و صدای ناهنجار، کاهش یا افزایش غیر طبیعی دمای سالن، کاهش شدید رطوبت، قطع ناگهانی دان یا آب و قطع ناگهانی تهویه خودداری فرمایید.

۲۳- از سیستم داکت منتهی به حوضچه ضد عفونی در پشت هوکش ها استفاده نمایید.

۲۴- نسبت به دفن بهداشتی تلفات یا سوزاندن لاشه ها با لاشه سوز اقدام نموده، از خارج کردن و رهاسازی لاشه طیور در بیرون از مرغداری اکیدا خودداری نمایید.

۲۵- هر نوع کاهش مصرف آب و دان، کاهش تولید یا افزایش تلفات در اسرع وقت به نزدیکترین اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع داده شود.

